

---

## TD n°2. Angles et distances

---

Licences Mathématiques

Automne 2013

Dans tous les exercices, on désigne par  $\mathcal{E}$  l'espace  $\mathbb{R}^3$  muni de sa structure euclidienne canonique. Le cube  $\mathcal{C}$  est celui dont les sommets ont pour coordonnées  $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$  dans la base canonique.

**Exercice 1.** Compléter le vecteur  $\frac{1}{\sqrt{5}}(1, \sqrt{3}, -1)$  en une base orthonormée directe de  $\mathbb{R}^3$ .

**Exercice 2.** Orthonormaliser la base  $(1, 0, 1)$ ,  $(0, 1, 2)$ ,  $(1, 1, 1)$ . Dans ce nouveau repère, donner les coordonnées des sommets du cube  $\mathcal{C}$ . Dessiner la projection du cube sur le plan engendré par les deux premiers vecteurs, sur papier millimétré.

**Exercice 3.** (angles et distances dans le cube  $\mathcal{C}$ )

- a) Calculer la longueur d'une diagonale.
- b) Calculer l'angle entre deux diagonales.
- c) Soit  $S$  un sommet et  $[SA]$ ,  $[SB]$  deux diagonales de faces adjacentes à  $S$ , dont l'une des extrémités est  $S$ . Calculer l'angle  $(\widehat{SA}, \widehat{SB})$ .

**Exercice 4.** Calculer le projeté orthogonal du point  $(1, 1, 1)$  sur la droite passant par  $(1, 0, 1)$  et dirigée par  $(2, 1, 0)$ , ainsi que le projeté orthogonal de ce même point sur le plan d'équation  $x - y + z = 1$ . Calculer les distances de ce point à cette droite et à ce plan.

**Exercice 5.** (le dodécaèdre en coordonnées) Dans toute la suite, on note  $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ . On a donc  $\phi^{-1} = \phi - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ . On considère le cube de coordonnées  $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ . Parmi ses sommets, on distingue  $K(-1, -1, 1)$ ,  $L(1, -1, 1)$ ,  $M(1, 1, 1)$  et  $N(-1, 1, 1)$  (situés sur la face « supérieure »). On définit enfin quatre nouveaux points  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$  de coordonnées  $(-\phi^{-1}, 0, \phi)$ ,  $(\phi^{-1}, 0, \phi)$ ,  $(0, -\phi, \phi^{-1})$  et  $(0, \phi, \phi^{-1})$ .

- a) Montrer que  $K$  et  $L$  sont sur le plan  $ABC$ .
- b) Montrer que les points  $A$ ,  $B$ ,  $L$ ,  $C$  et  $K$  sont les sommets (dans cet ordre) d'un pentagone régulier sur ce plan. On admet que  $\frac{1-\sqrt{5}}{4} = \cos(\frac{3\pi}{5})$ .
- c) En déduire que  $A$ ,  $B$ , et  $D$  sont des sommets d'un autre pentagone régulier, dont on précisera les (coordonnées des) deux autres sommets.
- d) Montrer enfin que les points  $L$ ,  $B$ ,  $M$  sont trois sommets consécutifs d'un troisième pentagone. Donner les coordonnées de ses deux autres sommets.
- e) Montrer que  $(BC) \perp (BN)$  et que  $(BK) \perp (BD)$ . Ceci permet de commencer à distinguer deux autres cubes dans le dodécaèdre. Il y a encore deux autres cubes, dont  $A$  est un sommet.